

ANZINA

Ostropomycetidae incertae sedis (osäker placering i denna underklass)

Göran Thor

Monotypiskt släkte, dvs. det innefattar endast denna art. De bleka, små, ofta rikligt förekommande apothecierna är karaktäristiska.

Litteratur: Lumbsch (1997).

Bestämningsnyckel—se *Trapeliopsis*.

Anzina carneonivea anzina

Bål vitaktig, tunn, slät, hel—sprickig, ofta som ett trådigt överdrag på mossor och växtrester. Fotobiont *Asterochloris*. Apothecier ensamma eller aggregerade 1–5 tillsammans, 0,1–0,4 mm i diameter, med blekbrunaktig–köttfärgad skiva som är platt–lätt konkav med tunn, vitaktig, ofta försvinnande kant, vilket gör att skivorna mer eller mindre kan flyta samman; epihymenium och hypothecium färglöst; parafyser förgrenade, 1,5 µm breda. Asci med 4(–8) sporer. Sporer färglösa, 1(–3)-septerade, 10–16 × 5–8 µm. Pyknid insänkta eller något upphöjda. Konidier 3,5–5 × 0,7 µm.

Bål och apothecier C+ röda, K–, KC+ röda, Pd–, UV± vit; gyrophorsyra, ± lecanorsyra.

På mossor, växtrester, bark och ved. Vrm Dlr Hls Hrj–TL, ta.

Den tunna bålen med de små, bleka apothecierna i kombination med förekomsten av gyrophorsyra gör arten ofta lätt att identifiera redan i fält.

